Je suis atteint(e) d'ostéogenèse imparfaite (fragilité des os). Pour cette raison, je peux facilement me fracturer. S'il vous plaît, tenez compte de mon avis (ou de ceux qui m'accompagnent) pour me mobiliser avec un maximum de précautions.

Merci de porter attention aux points suivants

- Des fractures peuvent se produire facilement, quelquefois même spontanément, chez ceux qui sont atteints d' Ostéogenèse Imparfaite.
- Les symptômes ne sont pas toujours évidents; une simple douleur peut être le signe d'une fracture.
- Une fracture peut être provoquée par un simple examen.
- Les fractures sont en règle générale douloureuses, mais ce n'est pas constant. – La douleur peut être révélatrice d'une fracture non visible à la radiographie.
- Des antalgiques appropriés sont recommandés pour les enfants, aussi bien que pour les adultes.
- Des calmants ou somnifères sont recommandés pendant les premières nuits suivant une fracture.
- La posologie pour les traitements médicamenteux et l'anesthésie doit être basée sur la taille du patient plutôt que sur son âge.
- Pour immobiliser une fracture, il est préférable d'utiliser des matériaux légers.
- Les malades atteints d'Ostéogenèse Imparfaite doivent être immobilisés le moins longtemps possible. – Merci de contacter le spécialiste qui me suit si une hospitalisation ou une chirurgie est nécessaire.
- De nombreux patients atteints d'ostéogenèse imparfaite présentent aussi une surdité.
- Merci de contacter le spécialiste qui me suit si une hospitalisation ou une chirurgie est nécessaire n° :

Les radiographies

- Le squelette d'un malade atteint d'Ostéogenèse Imparfaite ne présente que peu de contraste. Il faut abaisser le densité des rayons (comme en cas d'ostéoporose).
- L'emploi d'appareils mobiles est conseillé pour éviter des mouvements risquant d'occasionner de nouvelles fractures, et pour supprimer tout déplacement inutile.
- Il faut que les gonades soient protégées.
- Les malades ou leurs parents ont déjà eu l'expérience d'examens précédents. Ils peuvent donc vous aider à trouver la position la plus favorable pour les radiographies.
- Veuillez écouter le patient ou son parent : il sait comment il faut être pris.

Chirurgie & Anesthésie

- Mobiliser avec précaution le (la) patient (e) jusqu'à la table d'opération.
- Veuillez tenir compte de déformations ou contractures existantes en installant le patient.
- Renverser doucement la tête lors de l'intubation afin d'éviter toute fracture cervicale. Attention à la muqueuse trachéale. Les dents sont plus fragiles que chez une personne normale.